



HABLEMOS

ACERCA DEL **CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO.**

Para obtener más información, visite WWW.CDC.GOV/FASD

EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO ESTÁ ASOCIADO CON UN

MAYOR RIESGO DE

ABORTO ESPONTÁNEO

NACIMIENTO DE UN BEBÉ MUERTO

MUERTE SÚBITA

PARTO PREMATURO

ASÍ COMO UNA GAMA DE DISCAPACIDADES FÍSICAS, INTELECTUALES Y DE COMPORTAMIENTO DE POR VIDA, CONOCIDAS COMO TRASTORNOS DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL (FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS, FASD).

NO **EXISTE UNA CANTIDAD** DE ALCOHOL CONOCIDA QUE SEA SEGURA PARA CONSUMIR DURANTE EL EMBARAZO.



TODOS LOS TIPOS DE ALCOHOL PUEDEN **SER DAÑINOS,** INCLUIDOS



EL VINO TINTO O BLANCO,
LA CERVEZA
Y EL LICOR.

TAMPOCO **EXISTE UN MOMENTO** DURANTE EL EMBARAZO EN EL CUAL SEA SEGURO BEBER.



DURANTE EL EMBARAZO, EL ALCOHOL PUEDE

PASAR DE LA PERSONA EMBARAZADA

AL

FETO Y AFECTAR SU DESARROLLO.



EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO NO AFECTARÁ A TODOS LOS BEBÉS.

SIN EMBARGO, ES IMPOSIBLE SABER CUÁLES BEBÉS SE VERÁN AFECTADOS Y CUÁLES NO.



NO EXISTE UNA CANTIDAD CONOCIDA, UN MOMENTO ESPECÍFICO NI UN TIPO DE ALCOHOL QUE SEAN SEGUROS DURANTE EL EMBARAZO.